

13 марта 2020 г.

**Заявление организации Hypertension Canada относительно
COVID-19 на фоне гипертонии и терапии ингибиторами АПФ и
блокаторами рецепторов ангиотензина**

Наши эксперты изучают поступающие отчеты о вспышке COVID-19 в Китае, в которых содержатся предварительные данные о том, что гипертония может ассоциироваться с повышением риска летального исхода среди пациентов, находящихся на стационарном лечении. Также комиссия изучает учащающиеся сообщения о том, что подобным фактором риска могут быть определенные виды гипотензивной терапии — ингибиторами АПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина. На основании данных, имеющихся в нашем доступе на момент настоящего заявления, подтверждаем следующее.

- Среди пациентов, госпитализированных по поводу инфицирования COVID-19, велика доля лиц с высоким артериальным давлением (гипертонией).
- Тем не менее данных, подтверждающих, что при наличии гипертонии или при применении гипотензивной терапии ингибиторами АПФ или БРА риск нежелательного исхода инфицирования COVID-19 повышается, нет.
- Мы рекомендуем пациентам с гипертонией продолжать принимать назначенную им гипотензивную терапию.



Dr. Nadia Khan (д-р Надия Кхан),
председатель организации
Hypertension Canada